

流感、新型A型流感、腹瀉、腸病毒、登革熱防疫工作

- 一、流感為急性病毒性呼吸道疾病，常引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，但通常均在2~7天內會康復。
- 二、新型A型流感為早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀，嚴重者可能併發肺炎、急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡。
- 三、病毒性腸胃炎最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。主要症狀為水瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀。
- 四、腸病毒的傳染性極強，以4到9月為主要流行期，常引起之症狀為手足口病、疹性咽峽炎，有些時候則會引起一些較特殊的臨床表現，包括無菌性腦膜炎、病毒性腦炎、心肌炎、肢體麻痺症候群、急性出血性結膜炎等。
- 五、登革熱係由埃及斑蚊或白線斑蚊傳播的急性病毒性傳染病，臨床表現可從無症狀、輕微發燒至急性高燒伴有頭痛、後眼窩痛、肌肉和關節痛以及出疹等。
- 六、茲卡病毒主要是人被帶有茲卡病毒的病媒蚊叮咬，經過約3至7天的潛伏期後開始發病。茲卡病毒感染症亦於2016年2月提升為第五類法定傳染病。
- 七、學校強化處理作為及防治措施，如下：
 - (一)防疫小組應視疫情發展，每週或定期召開會議研商防疫事宜，持續完善各項減災、整備及應變。
 - (二)教職員工生應做好自主健康管理，隨時觀察學生健康狀況，如有類流感症

狀，請即刻戴口罩及就醫。

(三)掌握教職員工生至境外病例地區交流或旅遊之名單，落實追蹤自主健康管理紀錄。

(四)持續整備與購置校內相關防疫物資（含口罩、體溫計、消毒劑等）。

(五)定期清潔學生經常接觸的物品表面，如鍵盤、課桌椅、門把、公共區域的公共用品、教具等，並保持環境通風。

(六)持續提醒教職員工生應避免接觸禽鳥類，尤其切勿撿拾禽鳥屍體；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食。

(七)加強宣導學生、教職員工及家長於日常生活應勤洗手、重視衛生。

(八)學生如有生病情形，不要勉強到校上課；請假在家休養時亦應記得戴口罩及勤洗手，以免傳染其他家人。

(九)學校加強環境清理、清除積水容器及清刷積水場域，以避免病媒蚊孳生。